Jaatanlanti

07 14

Kabassiia bielaïa

Vass4R06s486-490

diamindomindadad





Collection Vassal-Montpellier

0Mtp559

Laboration Biclaria

XII 6 S'8

Kabassiia bielala





Kalassiia biela DESIGNATION CLOSXI PLANCHE 6 RANG S SOUCHE 8 Vigueur : 2 PORT : crig - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - (W - C Millerandage : Date de Véraison : 6.8 Date de Maturité : 17 4 6/ +4 Pourriture : 0 12 GRAPPE : G - W - D : L - W - C BAIE : TG - G - M - P (6 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR (:B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox - herb CHARGE : s 17 s X s 30 avec pépins - apyrène JUS : (Inc.) - coloré 多大

DESIGNATION Rabossia Dislaia CLOS XI PLANCHE & RANG & souche & Vigueur : 4 5 PORT : (erig) - ½ érig = couché. Pédoncule : L - M - C. Millerandage : 0 Date de Véraison: 27.7.70 Date de Maturité : 7.9.70 X +4 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - (P) ! L f M - C. BAIE : TG - G - P. 16x16 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULBUR : 69 - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 8 apyrène. s2) avec pépins sal g jus (inc. coloré.

```
DESIGNATION Robassia bielaia
CLOS XT PLANCHE 6 RANG & souche 8
Vigueur : 3
PORT : érig - & érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0,5
Date de Véraison: 5-8.71
Date de Maturité : 7 977
Pourriture :0 14
GRAPPE : G - (M )- P : L - M -
BAIE : TG - G - M - PISKIT
   disc. - sph. - off ov.
    obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (8)- m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s1 6
s2 o
     avec pépins - apyrène
s30
     JUS (inc. - coloré
s5 c
```

Année / 1968
Emplacement XII. 658 Désignation ... Kabassua bielaïa

	Nombre total	Dates							
		25.3	į.	!	! !	!	i		
1	2	2	Æ.E	1	!	1	1		
	1	1	1	1	!	1	1		
-3	2	1	1	3	į.	1	i		
7	¥	<u>g</u>	1	1	1	!	1		
· D	<u>r</u>	!	1	1	1	1	1		
23	1	!	4	1	1	1	1		
al.	1	9	1	1	1	1	1		
The same	7	t	1	1	1	1	1		
-1		9	j.	1	1	1	- 1		
5	p	*	i	1	i	i	1		
======			======		6 23-3				

Année:
Emplecement XII 6 58 Disignation Kabassüa bielaia

Nonbré	DAT : S				
total	4 3	3	4	4	
3	4	5	3	4	4
3	4	5	3	4	
5	6	7			
8	9				
10	10				

Année: 1970 Emplacement ... XII 658 Désignation / Kalapsisa bielaia

	! Nombre ! ! Total !			DATES				
	! d'yeux!!	2313	T !	i i	!	. !	Ţ	
1	14 1	2	!	!	!	1	!	
2	12		1	!	į.	İ	!	
3	19		!	!	!		1	
4	e		!	!	1	1	1	
5	11		1	1	1	1	!!	

D. le 23.3.70 -4

Désignation: Kabassiva bielaida
Emplacement: XII 658 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui ()- moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 90

cotonnoux 6.

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT,

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 19:67

Désignation: Kabessiia bielaia

Emplacement: XII 6 5 8 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Kabassira bielaia

Désignation :

Emplacement :

III. 658 +.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (5) rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 🗇 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation: Kabassiia bilaia

Emplacement: XII 658 A.1

FEUILLE ADULTE.

colonno potite 1 - moyenno 2 - grando (3) 34 -Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 -35 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Mervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (3) 37 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge B}

Coulour: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

entièrement rouge 4.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranécux () duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement () totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 0 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiolo/rameau: infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

 Calvo 1964

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno D- Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 6) - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ranification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de coulour blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée Ø- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière Ø- irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - cêtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse O- molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2) court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident O- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 🕥

33 - Do séparation facile (égrencuse) D- difficile 2.

Calvo 69

Kabania bielaia

DEMOMINATION: XIL 6,5 8 4 1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Ecorce détachant en m lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4) marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bendes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beigo marron clair (4), marron foncé (5), brua rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3), : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2).
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvoza

Emplacement: XII - 6-58 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) 10 - L2/L 1 -(2) 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1)-(2) - (5) 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 0 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme 0 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - (2)-(3) 18 - Angle lob. term. 1 (3) 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 -(2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L'₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. Forme : (4) - 5. Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Nº d'ordre: 2240.02 Désignation: Kabassiia bielaia

Origine :

Domergue 71